



**¿Qué sabes sobre
el VIH y**

**sobre las
pruebas de VIH?**



HOY VAS A APRENDER SOBRE EL VIH Y SOBRE LAS PRUEBAS DE VIH. APRENDERÁS SOBRE...

¿Qué sabes sobre el VIH y sobre las pruebas de VIH?

¿Qué es el VIH y qué son las pruebas del VIH?

¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA?

¿Cómo alguien se infecta con el VIH?

¿Cómo se puede prevenir el VIH?



TAMBIÉN APRENDERÁS POR QUÉ DEBERÍAS HACERTE UNA PRUEBA DE VIH.

Hacerse la prueba trae beneficios



MÁS ADELANTE, APRENDERÁS SOBRE ALGUNOS TIPOS DE PRUEBAS DE VIH Y EXPLICAREMOS LO QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE ESTAS PRUEBAS.


Hablaremos sobre las pruebas



¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA?



¿Qué es el VIH?



LAS LETRAS V-I-H SIGNIFICAN VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA.



Virus de la Inmunodeficiencia Humana

El VIH es un virus



Un virus es un tipo de organismo



A DIFERENCIA DE OTROS VIRUS, UNA VEZ QUE TE HAS INFECTADO CON EL VIH, ÉSTE SE QUEDA EN TU CUERPO PARA SIEMPRE.

El VIH es permanente



El VIH es permanente

Infectado para toda la vida

CUANDO TE INFECTAS CON EL VIH, EL VIRUS DAÑA TU SISTEMA INMUNOLÓGICO.

Sistema Inmunológico



VIH DAÑA TU SISTEMA INMUNOLÓGICO

Sistema Inmunológico



TU SISTEMA INMUNOLÓGICO DEFIENDE TU CUERPO CONTRA LAS ENFERMEDADES.

EL VIH ES EL VIRUS QUE CAUSA EL SIDA.



SIDA

¿Qué es el SIDA?



LAS LETRAS EN LA PALABRA SIDA SIGNIFICAN SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA.



Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

EL VIH Y EL SIDA ESTÁN RELACIONADOS, PERO NO SON LA MISMA COSA.

VIH ↔ SIDA



Infección de **VIH** reciente

INMEDIAMENTE DESPUÉS DE HABERSE INFECTADO CON EL VIH, LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS NO TIENEN NINGÚN CAMBIO EN SU CUERPO, O EN CÓMO SE SIENTEN.



SIN EMBARGO, ENTRE 3 A 6 SEMANAS DESPUÉS, ALGUNA DE ESTAS PERSONAS PUEDEN TENER SÍNTOMAS O SEÑALES...



Entre 3 y 6
semanas después
de la infección

... TALES COMO:

VIH



Síntomas

Fiebre

Pérdida de Peso

Sarpullido

Dolor de Garganta

**Gánglios linfáticos
Inflamados**

Cansancio

SI DESARROLLAS ESTOS SÍNTOMAS O SEÑALES DE 3 A 6 SEMANAS DESPUÉS DE HABERTE EXPUESTO AL VIH, QUIERE DECIR QUE TIENES UNA:



Infeción
aguda de
VIH

UNA INFECCIÓN DE VIH ES LA REACCIÓN INICIAL DE TU CUERPO AL SER INFECTADO CON EL VIH. SIN EMBARGO, ESTOS SÍNTOMAS O SEÑALES NO SIGNIFICAN QUE TENGAS SIDA.




Infeción
aguda de
VIH

Esto no significa
que tengas SIDA


AUNQUE TE RECUPERARÁS DE UNA INFECCIÓN AGUDA DE VIH EN UN PAR DE SEMANAS, EL VIH SE QUEDARÁ EN TU CUERPO PARA SIEMPRE.



COMO EL VIH DAÑA TU SISTEMA INMUNOLÓGICO O DEFENSAS..



... CON EL TIEMPO TE PUEDEN DAR ENFERMEDADES QUE UN CUERPO SANO PODRÍA NORMALMENTE COMBATIR.



CUANDO TE DAN ESTAS ENFERMEDADES SIGNIFICA QUE TIENES SIDA. SI TIENES VIH Y NO RECIBES EL TRATAMIENTO QUE NECESITAS, TE PUEDE TOMAR ENTRE 5 A 10 AÑOS PARA QUE- DESARROLLES SIDA.



LAS PERSONAS INFECTADAS CON EL VIH O QUE TIENEN SIDA PUEDEN VERSE COMPLETAMENTE SALUDABLES.

Se pueden ver saludables



DE HECHO, ESTAS PERSONAS SE PUEDEN VER IGUAL QUE LAS PERSONAS QUE NO TIENEN VIH O SIDA.

Pueden tener VIH y no lo saben





HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTÁN INFECTADAS CON EL VIH Y NO LO SABEN.




PERO, SON PORTADORAS DEL VIRUS Y PUEDEN INFECTAR A OTRAS PERSONAS.

Cualquier persona se puede infectar con el VIH




NO IMPORTA CUÁN JOVEN O VIEJO SEAS, SI ERES HOMBRE O MUJER...


... HETEROSEXUAL O GAY, O SI USAS DROGAS O NO.



No importa quién seas



O DE DÓNDE VENGAS



¡Lo que haces sí importa!




EL VIH SE TRANSMITE, O PASA DE UNA PERSONA QUE TIENE VIH A UNA PERSONA QUE NO LO TIENE.

EL VIH SE PUEDE TRANSMITIR DE HOMBRE A MUJER Y DE MUJER A HOMBRE...



...DE HOMBRE A HOMBRE...



...Y DE MUJER A MUJER.



**NO PUEDES INFECTARTE CON
EL VIH A TRAVÉS DE**

Saliva

Sudor

Lágrimas


Orina



**NO PUEDES INFECTARTE CON EL VIH
SI ALGUIEN TOSE O ESTORNUDA A TU
ALREDEDOR**



¡Salud!



**NO PUEDES INFECTARTE CON EL VIH
A TRAVÉS DE PICADURAS**



**TAMPOCO PUEDES INFECTARTE CON EL VIH A TRAVÉS DE LAS
PICADURAS DE MOSQUITO O DE CUALQUIER OTRO INSECTO, AUNQUE
PIQUEN A UNA PERSONA CON VIH Y DESPUÉS TE PIQUEN A TI.**

EL VIH NO SE TRANSMITE A TRAVÉS DEL CONTACTO DIARIO. POR LO TANTO, ABRAZAR, COMPARTIR UN BAÑO, DARSE LA MANO, COMPARTIR COMIDA O BEBIDAS...



El contacto diario es seguro



...Y BESAR NO TRANSMITEN EL VIH.

PUEDES INFECTARTE CON EL VIH A TRAVÉS DE



Sangre
Semen
Pre-Eyaculación
Flúidos Vaginales*
Leche Materna

*TAMBIÉN - PUEDES INFECTARTE CON EL VIH A TRAVÉS DE FLÚIDOS VAGINALES, AÚN SI LA MUJER NO ESTÁ MENSTRUANDO.

TE PUEDES INFECTAR CON EL VIH AL TENER SEXO VAGINAL O ANAL SIN USAR CONDÓN.





Y TAMBIÉN TE PUEDES INFECTAR CON EL VIH AL COMPARTIR JERINGUILLAS O AGUJAS CUANDO TE INYECTAS COCAÍNA, METANFETAMINA CRISTAL, HEROÍNA, HORMONAS O ESTEROIDES.

PELIGRO
Al compartir agujas o jeringuillas



MIENTRAS MÁS A MENUDO TENGAS SEXO VAGINAL O ANAL SIN CONDÓN...

PELIGRO
Al tener sexo sin condón
(vaginal o anal)



... O COMPARTAS AGUJAS O JERINGUILLAS, MÁS
POSIBILIDADES TENDRÁS DE INFECTARTE CON EL VIH.

PELIGRO

Al compartir agujas o jeringuillas



PERO RECUERDA, TE PUEDES INFECTAR CON EL VIH SI
TIENES SEXO SIN CONDÓN O COMPARTES
AGUJAS TAN SOLO UNA VEZ.



AL TENER SEXO SIN CONDÓN
(VAGINAL O ANAL),
AL COMPARTIR AGUJAS O JERINGUILLAS
AUNQUE SÓLO SEA UNA VEZ


UNA MUJER INFECTADA CON EL VIH LE PUEDE
TRANSMITIR EL VIH A SU BEBÉ DURANTE...



...EL EMBARAZO, EL PARTO O LA LACTANCIA.

Una infección de VIH
se puede prevenir

EL VIH SE PUEDE PREVENIR USANDO
CONDONES DURANTE EL SEXO ...



...NO TENIENDO SEXO...



... O TENIENDO MENOS
PAREJAS SEXUALES.



Situaciones Difíciles



HAY SITUACIONES EN LAS QUE SE TE PUEDE
HACER DIFÍCIL RECORDAR USAR CONDONES.
POR EJEMPLO, CUANDO...

...TOMAS ALCOHOL O USAS DROGAS, VENDES SEXO O PAGAS POR
TENER SEXO, USAS DROGAS O MEDICAMENTOS QUE SON
ESTIMULANTES SEXUALES.



POR ESO, RECUERDA SER MÁS CUIDADOSO EN ESTAS SITUACIONES.

¡Ay, caramba!
¡Se me olvidó usar condones!



Tengo que decirte algo.



AL HABLAR CON TUS PAREJAS SEXUALES SOBRE EL VIH


¡Tenemos que protegernos!




...PUEDES SABER SI ESTÁN INFECTADAS O EN RIESGO DE CONTRAER VIH.

PERO TEN EN CUENTA QUE PUEDE QUE TUS PAREJAS SEXUALES NO TE DIGAN SI TIENEN VIH.


¿Y si mi pareja anterior tiene VIH o SIDA?



O, PUEDE QUE TUS PAREJAS SEXUALES NO SEPAN SI TIENEN VIH Y SE VEAN COMPLETAMENTE SALUDABLES.



TAMBIÉN ES POSIBLE QUE TUS PAREJAS SEXUALES NO SEPAN SI LAS PERSONAS CON LAS QUE TUVIERON SEXO EN EL PASADO TENÍAN VIH.



TU TAMBIÉN PUEDES EVITAR INFECTARTE CON EL VIH AL NO INJECTARTE DROGAS.

Una infección de VIH se puede prevenir



No te inyectes drogas

PERO SI TE INYECTAS DROGAS, USA AGUJAS O JERINGUILLAS LIMPIAS ...

Una infección de VIH se puede prevenir



No te inyectes drogas

...Y NUNCA LAS
COMPARTAS.

Una infección de VIH
se puede prevenir



Nunca compartas agujas
o jeringuillas



COMO ÚLTIMO RECURSO, EL CLORO O
BLANQUEADOR PUEDE AYUDARTE A REMOVER
EL VIH DE AGUJAS O JERINGUILLAS ANTES DE
USARLAS.

Entonces, ¿por qué deberías hacerte
la prueba del VIH?



La única manera de saber es
haciéndote la prueba



LOS PROFESIONALES MÉDICOS RECOMIENDAN QUE TE HAGAS LA PRUEBA DEL VIH...


Hacerse la prueba del VIH es recomendable



... EN CASO DE QUE TE HAYAS EXPUESTO AL VIH Y NO LO SEPAS.



¿Tenían VIH?



ADEMÁS, PUEDE QUE NO SEPAS SI LAS PERSONAS CON LAS QUE ÉSTAS TENIENDO SEXO O COMPARTIENDO AGUJAS TIENEN VIH,...

... O SI ESTÁN TENIENDO SEXO O COMPARTIENDO AGUJAS CON ALGUIEN MÁS.



CUANDO EL VIH SE DIAGNOSTICA Y SE TRATA A TIEMPO PUEDES CUIDARTE Y MANTENERTE SALUDABLE POR MÁS TIEMPO.



AL MANTENERTE SALUDABLE AYUDAS A TU FAMILIA Y A LOS QUE DEPENDEN DE TI.



El tratamiento médico que necesites



AL DECIRLE A TUS DOCTORES QUE TIENES VIH, PUEDES RECIBIR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE NECESITES.

No recibir tratamiento puede causar serios problemas de salud



SI ESTÁS EMBARAZADA Y ESTÁS INFECTADA CON EL VIH, HAY MEDICAMENTOS QUE PUEDES TOMAR PARA PREVENIR QUE TU BEBÉ SE INFECTE CON EL VIH.



Protege
a tu bebé



Tengamos sexo seguro.



TAMBIÉN PUEDES TOMAR
PRECAUCIONES PARA PREVENIR
INFECTAR A OTROS, TALES COMO...

Por supuesto! Yo solo
practico sexo sin riesgo.



... USAR CONDONES Y NO COMPARTIR AGUJAS
O JERINGUILLAS.

Deberías hacerte la prueba de VIH.



PUEDES DECIRLE A LAS PERSONAS CON LAS QUE HAYAS TENIDO SEXO O COMPARTIDO AGUJAS O JERINGUILLAS QUE...

Claro, lo haré.



...DEBEN HACERSE LA PRUEBA.

Las parejas deben hacerse la prueba



EN LA MAYORÍA DE LUGARES HAY SERVICIOS PARA NOTIFICAR A LAS PAREJAS QUE DEBEN HACERSE LA PRUEBA.

ENTERARTE DE QUE ESTÁS INFECTADO CON EL VIH PUEDE CAUSAR UN FUERTE IMPACTO EN TU VIDA.

SABER QUE ESTÁS INFECTADO CON EL VIH PUEDE SER ESTRESANTE.

ESTRÉS

LAS PERSONAS QUE SE HAN ENTERADO DE QUE ESTÁN INFECTADAS CON EL VIH PUEDEN SENTIRSE AISLADAS O COMPLETAMENTE SOLAS.

SENTIRTE SOLO

TAMBIÉN, PUEDE QUE ALGUNAS PERSONAS CON VIH TENGAN PROBLEMAS DE DINERO, CON EL SEGURO MÉDICO, Y MÁS GASTOS MÉDICOS.

dinero o seguro médico

PROBLEMAS

SIN EMBARGO, HAY MUCHOS RECURSOS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS CON ESTOS PROBLEMAS.




AUNQUE LOS CIENTÍFICOS ESTÁN TRABAJANDO EN UNA VACUNA PARA EL VIH, NO HAY UNA VACUNA LISTA Y APROBADA PARA PREVENIR EL VIH. Y TODAVÍA NO HAY CURA.

No hay una vacuna aprobada y no hay cura para el VIH

PERO, SI TE HAS INFECTADO CON EL VIH, HAY TRATAMIENTOS MÉDICOS DISPONIBLES QUE TE PUEDEN AYUDAR A VIVIR UNA VIDA MÁS LARGA Y PLENA.




Pruebas de VIH



HAY MUCHAS PRUEBAS DE VIH.

El tipo de prueba depende de tus necesidades médicas y de dónde te hagas la prueba



Prueba de VIH



**MUESTRA
DE SANGRE**

PUEDES HACERTE UNA PRUEBA DE VIH CON UNA MUESTRA DE TU SANGRE O UNA MUESTRA DE TUS FLUIDOS ORALES.



**MUESTRA
DE FLUIDOS
ORALES**

LA MUESTRA DE SANGRE SE SACA DE LA MISMA MANERA COMO SE SACA PARA CUALQUIER OTRO EXAMEN DE SANGRE, O CON UN PINCHAZO EN EL DEDO.



LA MUESTRA DE FLUIDOS ORALES SE SACA USANDO UN PEQUEÑO INSTRUMENTO.



PARA ALGUNAS PRUEBAS DE VIH, PUEDES OBTENER TUS RESULTADOS EN POCOS MINUTOS. ESTAS PRUEBAS SE CONOCEN COMO PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH.



PARA OTRAS PRUEBAS DE VIH, TU SANGRE O FLUIDOS ORALES SE ENVÍAN A UN LABORATORIO PARA SER EXAMINADOS.




PARA OBTENER LOS RESULTADOS DE ESTAS PRUEBAS ES POSIBLE QUE TENGAS QUE ESPERAR 1 O 2 SEMANAS. TAMBIÉN ES POSIBLE QUE TENGAS QUE REGRESAR AL LUGAR DONDE TE HICISTE LA PRUEBA PARA SABER TUS RESULTADOS.




AUNQUE ESPERAR POR TUS RESULTADOS PUEDE SER ESTRESANTE, ES MUY IMPORTANTE QUE RECIBAS TUS RESULTADOS PARA SABER SI TIENES VIH.


HAY OTRA COSA MUY IMPORTANTE QUE DEBES SABER SOBRE LAS PRUEBAS DE VIH...



... PUEDE TOMAR HASTA TRES MESES PARA QUE LA PRUEBA DE VIH DETECTE LA PRESENCIA DE VIH EN TU CUERPO DESPUÉS DE QUE TE HAYAS INFECTADO CON EL VIRUS.



El tiempo se conoce como el **Período de Ventana**



EL TIEMPO QUE TOMA LA PRUEBA DE VIH EN DETECTAR EL VIH EN TU CUERPO DESPUÉS DE QUE TE INFECTASTE SE CONOCE COMO EL PERÍODO DE VENTANA O EL TIEMPO DE ESPERA.

DURANTE EL PERÍODO DE VENTANA PUEDE QUE SEA MUY TEMPRANO PARA QUE LA PRUEBA DE VIH MUESTRE CORRECTAMENTE QUE TIENES VIH...



... ES DECIR, SI RECIBES UNA PRUEBA DE VIH DURANTE EL PERIODO DE VENTANA, TU PRUEBA DE VIH PUEDE DECIR QUE NO TIENES VIH O QUE EL RESULTADO ES NEGATIVO, AÚN CUANDO ESTÁS INFECTADO CON VIH.



PERO SI ESTÁS INFECTADO CON EL VIH, PUEDES TRANSMITÍRSELO A OTROS DURANTE ESTE PERÍODO...



...POR ESO, ES MUY IMPORTANTE QUE RECUERDES USAR CONDONES Y NO COMPARTAS AGUJAS O JERINGUILLAS DURANTE ESTE TIEMPO.

POR ESTA RAZÓN, SI EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES HICISTE COSAS QUE PUDIERON PONERTE EN RIESGO DE INFECTARTE CON EL VIH...

Sexo sin condones.

Compartí agujas o jeringuillas.

Sexo con varias parejas.

... ES POSIBLE QUE NECESITES OTRA PRUEBA EN EL FUTURO.

Quizás necesite otra prueba de **VIH** en el futuro.

¿Y si me infecté recientemente?

EN ALGUNOS CASOS, PUEDES OBTENER UNA PRUEBA TEMPRANA O ESPECIAL...

... PARA AYUDARTE A SABER MÁS PRONTO SI TIENES VIH.

VIH

Pruebas Especiales Para una infección de **VIH** reciente

ESTAS PRUEBAS ESPECIALES O TEMPRANAS DE VIH TE PUEDEN AYUDAR A SABER SI TIENES UNA "INFECCIÓN AGUDA DE VIH."

RECUERDA, UNA INFECCIÓN AGUDA DE VIH ES LA REACCIÓN INICIAL DEL CUERPO QUE APARECE 3 A 6 SEMANAS DESPUÉS DE HABERTE INFECTADO CON EL VIH.

Pruebas Especiales Infección aguda de **VIH**


Infección aguda de **VIH**



SI CREES QUE TE INFECTASTE CON EL VIH RECIENTEMENTE Y TIENES SÍNTOMAS O SEÑALES DE UNA INFECCIÓN AGUDA DE VIH...



Puedes necesitar una prueba especial



PUEDES PREGUNTARLE A TU PROVEEDOR MÉDICO SI UNA PRUEBA TEMPRANA O ESPECIAL ESTÁ DISPONIBLE, Y SI ES ADECUADA PARA TI.



HAY 2 RESULTADOS PARA LAS PRUEBAS DE VIH: NEGATIVO Y POSITIVO.

Posibles Resultados



NEGATIVO



POSITIVO

UN RESULTADO NEGATIVO SIGNIFICA QUE NO SE ENCONTRÓ VIH EN TU CUERPO.



NEGATIVO

No se detectó VIH

PERO RECUERDA, DEBIDO AL PERÍODO DE VENTANA PUEDE QUE SEA DEMASIADO PRONTO PARA QUE LA PRUEBA MUESTRE SI TIENES VIH.



Puede que sea demasiado pronto para detectar el VIH

POR LO TANTO, PUEDE QUE NECESITES OTRA PRUEBA DE VIH EN EL FUTURO.



Para estar seguro, hazte la prueba de nuevo en tres meses

O, PARA ENTERARTE SI TE HAS INFECTADO RECIENTEMENTE, PUEDE QUE NECESITES UNA PRUEBA ESPECIAL PARA UNA INFECCIÓN AGUDA DE VIH.

Resultado Positivo

POSITIVO
PRELIMINAR

POSITIVO
DEFINITIVO

UN RESULTADO POSITIVO DE UNA PRUEBA DE VIH PUEDE SER PRELIMINAR O DEFINITIVO, DEPENDIENDO DE SI TE HICISTE UNA PRUEBA RÁPIDA DE VIH O NO.

SI TE HICISTE UNA PRUEBA RÁPIDA DE VIH..

Resultado de una prueba rápida de VIH



... Y EL RESULTADO SALIÓ POSITIVO, ESTE ES UNICAMENTE UN RESULTADO POSITIVO PRELIMINAR.

Puedes estar infectado




UN RESULTADO POSITIVO PRELIMINAR SIGNIFICA QUE PUEDE QUE ESTÉS INFECTADO CON EL VIH Y QUE PUEDES INFECTAR A LOS DEMÁS.




SIN EMBARGO, ESTE NO ES UN RESULTADO FINAL.

SI EL RESULTADO DE LA PRUEBA RÁPIDA DE VIH ES POSITIVO PRELIMINAR...





DEBE SER CONFIRMADO CON UNA PRUEBA ADICIONAL DE VIH. LA PRUEBA ADICIONAL DE VIH TE DIRÁ SI ESTÁS INFECTADO CON VIH O NO.



PUEDE TOMAR UNA SEMANA O MÁS OBTENER LOS RESULTADOS FINALES. ES MUY IMPORTANTE QUE RECIBAS TUS RESULTADOS FINALES PARA QUE PUEDAS SABER SI TIENES VIH.

Posibles Resultados



POSITIVO DEFINITIVO
Tienes VIH

PARA TODO TIPO DE PRUEBAS, UN RESULTADO POSITIVO DEFINITIVO QUIERE DECIR QUE TIENES VIH.

PERO RECUERDA, ESTO SIGNIFICA QUE PUEDES TRABAJAR CON TUS PROVEEDORES DE SALUD PARA RECIBIR EL TRATAMIENTO QUE NECESITAS Y PARA PREVENIR INFECTAR A OTROS.



LOS RESULTADOS DE TU PRUEBA DE VIH SE TE
EXPLICARÁN.





SIÉNTETE LIBRE DE HACER PREGUNTAS SI NO ENTIENDES
TUS RESULTADOS.






AQUÍ HAY ALGUNOS PUNTOS QUE RECORDAR:

- ✓ EL VIH es el virus que causa el SIDA
- ✓ El VIH se transmite a través del sexo sin condón o al compartir agujas o jeringuillas










PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR:

- **CONSEJERO DE VIH**
- **PROVEEDOR DE SERVICIOS DE SALUD
O PROVEDOR MÉDICO**
- **AGENCIA DE SALUD NACIONAL O LOCAL**



CREADORAS DEL GUIÓN:

ROLAND C. MERCHANT, MD, MPH, SCD
ASSOCIATE PROFESSOR
EMERGENCY MEDICINE AND EPIDEMIOLOGY
WARREN ALPERT MEDICAL SCHOOL AND SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
BROWN UNIVERSITY
RHODE ISLAND HOSPITAL

MELISSA A. CLARK, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR OF EPIDEMIOLOGY AND OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
WARREN ALPERT MEDICAL SCHOOL AND SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
BROWN UNIVERSITY

CLAUDIA SANTELICES, PHD
ASSOCIATE RESEARCH SCIENTIST
NORTHEASTERN UNIVERSITY
INSTITUTE ON URBAN HEALTH RESEARCH

DHARMA E. CORTÉS, PHD
SENIOR RESEARCH ASSOCIATE
MAURICIO GASTÓN INSTITUTE FOR LATINO COMMUNITY DEVELOPMENT & PUBLIC POLICY
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AT BOSTON
ADJUNCT ASSOCIATE PROFESSOR
BOUVÉ COLLEGE OF HEALTH SCIENCES, NORTHEASTERN UNIVERSITY

NAIRA ARELLANO, MPH
SENIOR RESEARCH ASSISTANT
RHODE ISLAND HOSPITAL

AYANARIS REYES, BS
SENIOR RESEARCH ASSISTANT
RHODE ISLAND HOSPITAL

COLABORADORES:

CALIFORNIA DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH OFFICE OF AIDS
SACRAMENTO, CA

PRODUCTORA:

STACEY IRWIN CHRISTIE
CHICAGO, IL

PRODUCCIÓN AND POST PRODUCCIÓN:

BIG SHOULDERS DIGITAL VIDEO
CHICAGO, IL

FOLLETO PREPARADO POR:

INFINITUM LIMITED
INFINITUMLIMITED.COM

FOLLETO PREPARADO POR:

VERA BERNARDINO, BS
SENIOR RESEARCH ASSISTANT
RHODE ISLAND HOSPITAL

DORA ESTRELA, BA
SENIOR RESEARCH ASSISTANT
RHODE ISLAND HOSPITAL

FINANCIAMIENTO:

NATIONAL INSTITUTE ON NURSING RESEARCH

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A LOS CLIENTES Y PERSONAL DE:

DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE AND DIVISION OF INFECTIOUS DISEASES
OLIVE VIEW-UCLA MEDICAL CENTER
LOS ANGELES, CA

UNION POSITIVA, INC.
MIAMI, FL

PROJECT VIDA
CHICAGO, IL

VIDA/SIDA
PUERTO RICAN CULTURAL CENTER
CHICAGO, IL

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO
SAN JUAN, PR

DORCAS PLACE
PROVIDENCE, RI

INTERNATIONAL INSTITUTE OF RHODE ISLAND
PROVIDENCE, RI

RHODE ISLAND HOSPITAL
EMERGENCY DEPARTMENT AND AMBULATORY
CARE CLINIC
PROVIDENCE, RI

BEAT AIDS
SAN ANTONIO, TX

HOPE ACTION CARE
SAN ANTONIO, TX

SAN ANTONIO AIDS FOUNDATION
SAN ANTONIO, TX

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL USO DE ESTE FOLLETO SE AUTORIZA PARA INSTALACIONES CLÍNICAS, PROFESIONALES DE LA SALUD, PARA AQUELLOS QUE PARTICIPAN O QUE SON PROVEEDORES O ADMINISTRADORES DE LA PRUEBA DEL VIH Y PARA USOS EDUCATIVOS. USOS COMERCIALES O MODIFICACIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN PROHIBIDOS. EL FOLLETO FUE PRODUCIDO EXCLUSIVAMENTE PARA FINES EDUCATIVOS Y SU PROPÓSITO NO ES PROPORCIONAR INFORMACIÓN DEFINITIVA SOBRE EL DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO DE VIH O SIDA.



**Actúa con
inteligencia.**

**¡Hazte la prueba
del VIH!**

